

آسپرین چه دارویی است و کاربرد آن چیست ؟

آسپرین یا ASA از گروه داروهای ضد درد غیرمخدر، ضد تب، ضد التهاب و مانعی برای تجمع پلاکت های خون و ایجاد لخته می باشد .

از این دارو می توان به عنوان ضد درد و ضد تب در کودکان و بزرگسالان استفاده کرد .

در دردهای آرتريت کاربرد دارد .

در اختلالات ترومبوآمبولی (ایجاد لخته در وریدهای عمقی) تجویز می شود .

آسپرین را برای پایین آوردن ریسک سکته قلبی در بیمارانی که داراری درد قلبی هستند و در افرادی که سابقه ی سکته قلبی در گذشته را داشته اند، تجویز می کنند .



ASA
ASPRIN

مجاز به مصرف چه مقداری از این دارو هستیم ؟

مقدار و دوز دارو باید کاملا به دستور پزشک

باشد و به دلیل تداخل آن با داروهای دیگر و نیز

به اصطلاح رقیق کردن خون و افزایش مقدار

خونریزی در برخی از بیماری ها، از مصرف

خودسرانه و تغییر دوز دارو خودداری نمایید .

مصرف در دوران شیردهی و بارداری چگونه است ؟

در دوران بارداری ممکن است دارای خطراتی

بالقوه باشد و باید با مشورت پزشک مربوطه

مصرف شود.

در دوران شیردهی به دلیل ورود دارو به شیر ،

مصرف آن ممنوع است.

آسپرین در چه کسانی نباید مصرف شود ؟

* در افرادی که سابقه ی حساسیت مفرط به سالیسیلات ها و سایر ضد التهاب های غیر مخدری دارند .

* رینیت مزمن (التهاب مخاط و آبریزش بینی طولانی مدت) .

* کهیر مزمن .

* اطفال زیر دو سال .

* کودکان و نوجوانان مبتلا به آبله مرغان یا بیماری های شبه آنفلوآنزا (خطر سندرم ری) .

* افراد دارای خونریزی فعال و سایر مشکلات گوارشی .

* افراد دارای سابقه ی زخم معده .

* بیمارانی که حساسیت به آسپرین ، پولیپ بینی و آسم دارند .

* در نارسایی قلب .

* در اختلالات خونریزی دهنده .





دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آسپرین



مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

واحد آموزش به بیمار

تلفن بیمارستان: ۰۶۶۳۳۴۰۸۸۹۸۰

داخلی ۱۳۷-۱۴۳-۱۴۵

تلفن پیگیر: ۰۹۱۶۵۷۴۴۶۷۷

به چه نکاتی هنگام مصرف آسپرین باید توجه کنیم؟

تحریک معدی ناشی از آسپرین ، در صورت مصرف آن با یک لیوان پر از آب ، شیر ، یا آنتی اسید به حداقل می رسد .

قرص ، همراه با غذا یا بعد از آن مصرف شود تا خطر اختلال گوارشی آن کاهش یابد .
آسپرین را در مکانی سرد و خشک نگهداری کنید ، رطوبت ممکن است باعث شود که آسپرین قدرت خود را از دست بدهد .
به تاریخ انقضاء دارو توجه شود و اگر قرص ها بویی شبیه به سرکه بدهند ، نباید مصرف شوند .

در سالمندان به دلیل طولانی شدن متابولیسم دارو در بدن به میزان کمتری از دارو نیاز است و باید در این مورد با پزشک معالج مشورت

منبع:

داروهای ژنریک ایران- محمد پارچه باف بیگدلی

انتشارات رودگون-۱۴۰۱

عوارض آسپرین :

عوارض داروی آسپرین دو دسته می باشد:

عوارض شایع :

تهوع ، سوزش سر دل ، درد معده ، وزوز گوش ، راش پوستی ، خون مردگی .

عوارض خطرناک :

خونریزی گوارشی ، سندرم ری در کودکان (نوعی بیماری که باعث تورم کبد شده) ، شوک آنافیلاکتیک (واکنش حساسیتی شدید)، ایجاد بیماری در اثر تخریب برخی از گلبول های سفید، کاهش تعداد پلاکت های خون.



آسپرین