

METORAL

هنگام مسمومیت با متورال باید چکار

کنیم؟

بافاصله بعد از مشاهده علائمی هم چون کاهش زیاد تعداد ضربانات قلب به طور ناگهانی و کاهش فشار خون شدید و تنگی نفس ، بیمار را به اورژانس بیمارستان منتقل کرده تا از شارکول فعال استفاده



قرص متورال چه عوارضی دارد؟

عوارض شایع : سرگیجه ، خستگی ، کاهش فشار خون ، کاهش تعداد ضربانات قلب .

عوارض غیر شایع : افسردگی ، خواب آلودگی ، سردرد ، بی خوابی ، کابوس شبانه ، سردی اندام ها ، بیماری رینود (نوعی بیماری که به دلیل کاهش جریان خون در رگ ها ایجاد می شود) ، یبوست ، اسهال ، تهوع ، انقباض برونش های ریه و تنگی نفس ، راش و خارش ، کاهش میل جنسی .

عوارض خطرناک : کاهش تعداد ضربانات قلب به کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه ، نارسایی قلبی ، ایجاد اختلال در ریتم قلب .



معرفی و کاربرد متورال :

قرص متورال به عنوان یکی از داروهای ضروری و مهم در پزشکی برای درمان فشار خون بالا، درد قفسه ی سینه و پیشگیری از حملات و سکتته های قلبی و مشکلات کلیوی استفاده می شود .

از کاربردهای مهم این دارو، تجویز در ادم ناشی از بیماری های کلیوی یا نارسایی قلب است.

متورال ، در مبتلایان به سکتته قلبی ، تعداد ضربان قلب و فشار خون و برون ده قلبی را کاهش می دهد.

این دارو در کاهش دردهای ناشی از بیماری های دریچه ای نیز کاربرد دارد .

چه مقداری از دارو را می توانم در طول روز

مصرف کنم؟

به دلیل اثرات بالای این دارو بر روی تعداد ضربانات قلب و فشارخون، به هیچ عنوان خودسرانه دارو را مصرف نکنید و از کم و زیاد کردن مقدار دارو نیز اجتناب ورزید .

دارو فقط باید با تجویز پزشک معالج مصرف کرد .

متورال



مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

واحد آموزش به بیمار

تلفن بیمارستان: ۰۶۶۳۳۴۰۸۸۹۸

داخلی ۱۳۷-۱۴۳-۱۴۵

تلفن پیگیر: ۰۹۱۶۵۷۴۴۶۷۷

متورال با چه داروهایی تداخل دارد؟

متورال با داروهای زیادی تداخل دارد و علاوه بر کم و زیاد شدن اثر خود دارو روی بدن، روی اثر گذاری آن ها نیز نقش دارد، به همین دلیل هنگام تجویز آن توسط پزشک حتما باید نام داروهای مصرفی خود را به پزشک بگویید.

آمیودارون - لیدوکائین

فنوباریتال و ...

داروهای ضد فشارخون

گلیکوزیدهای قلبی (دیگوکسین و...)

کلونیدین - هیدرالازین

سایمتیدین

وراپامیل

منبع:

داروهای ژنریک ایران . انتشارات حیدری . ۱۴۰۱

دکتر بهروز حیدری



نکاتی که هنگام مصرف متورال باید مدنظر داشته باشیم :

جهت جلوگیری از بی خوابی ، از مصرف دارو در انتهای شب خودداری کنید .

دارو را دقیقا طبق تجویز مصرف کنید .

به دلیل جذب گوارشی بالا ، دارو را همراه با غذا مصرف کنید .

بیماران دیابتی بدانند که این دارو می تواند علائم کاهش قندخون را پنهان کند .

از قطع ناگهانی دارو اجتناب کنید و قطع آن باید به صورت تدریجی باشد .

هنگام مصرف دارو باید فشار خون و تعداد ضربانات قلب مدام چک و کنترل شود.

به دلیل احتمال داشتن عوارض ، در زنان باردار باید با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف شود .