

در چه مواردی مصرف کاپتوپریل باید با احتیاط باشد؟

- بیماران کلیوی خصوصا در تنگی شریان کلیه همراه با داروهایی که موجب سرکوب مغز استخوان می شوند .
 - هایپوناترمی (کاهش سدیم خون) .
 - هایپوولمی (حالتی که بدن فرد در معرض کم آبی قرار دارد ، مثل اسهال یا بیماری های اخیر مسبب آن) .
 - نارسایی مغزی و قلبی .
 - بیمارانی که تحت دیالیز قرار دارند .
 - در بیماری لوپوس، سابقه ی ورم صورت و زبان و گلو .
 - داشتن سابقه ی حساسیت به لوزارتان و والسارتان
- تداخل دارویی خاصی بزی کاپتوپریل بیان نشده است، اما با داروهای ضداسید معده و داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مثل آسپرین و ایندومتاسین باید با فاصله مصرف شود .

آیا زنان باردار و شیرده می توانند از کاپتوپریل استفاده نمایند؟

بر اساس مطالعات انسانی ، مصرف این دارو در سه ماهه ی دوم و سوم باعث صدمه به جنین و یامرگ وی می شود . پس از تشخیص باردار بودن هرچه سریع تر مصرف دارو را قطع کنید . ولی طبق مطالعات ، داروی کاپتوپریل وارد شیر نمی شود ، در نتیجه در دوران شیردهی منع مصرف ندارد و سازگار می باشد . اما به این نکته دقت شود که نوزادان و شیرخواران در معرض خطر بالای سمیت هستند ، لذا باید دارو را تحت نظر پزشک مصرف نمود .

در چه کسانی مصرف کاپتوپریل ممنوع است؟

- در افراد با سابقه ی آنژیوادم قلبی در اثر داروهای

مهرکننده ی ACE

- در افراد باردار

دسته ی دارویی و کاربرد کاپتوپریل :

کاپتوپریل از دسته ی داروهای ضد فشارخون می باشد .

از این دارو در فشارخون های بالا (بزرگسالان و کودکان) و به عنوان داروی کمکی در درمان نارسایی مزمن قلبی (CHF) و ادم ناشی از آن به دلیل داشتن اثر کاهندگی بار قلبی ، استفاده می شود .

در اختلال عملکرد بطن چپ بعد از سکته ی قلبی و در ایسکمی های قلبی تجویز می شود .



چه میزانی از دارو را میتوان روزانه

مصرف کرد؟

میزان و زمان مصرف دارو باید طبق دستور پزشک معالج باشد و از مصرف خودسرانه ی کاپتوپریل خودداری کنید .



کاپتوپریل



مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

واحد آموزش به بیمار

تلفن بیمارستان: ۰۶۶۳۳۴۰۸۸۹۸

داخلی ۱۳۷-۱۴۳-۱۴۵

تلفن پیگیر: ۰۹۱۶۵۷۴۴۶۷۷

در مصرف کاپتوپریل چه نکاتی باید مدنظر

باشد ؟

در بیماران سالمند به دلیل به وجود آمدن بیشتر اثرات کاهندگی فشارخون و در نارسایی کلیوی باید مقدار کمتری از دارو را دریافت کنند .

چون احتمال سرگیجه در اولین نوبت مصرف وجود دارد، بهتر است شب پیش از خواب دارو را مصرف کنید .

با غذا تداخل خاصی ندارد ولی بهترین زمان مصرف آن که یک ساعت قبل از غذا می باشد .

داروی فراموش شده ی یک نوبت را بلافاصله بعد از یادآوری مصرف کنید، اما از دوبرابر کردن مقدار دارو در یک نوبت جدا خودداری کنید .

دارو را در ظرف مقاوم به نور و در دمای حداکثر ۳۰ درجه ی سانتی گراد نگهداری کنید .

اگر علائم آنژیوادم (تورم صورت، لب ها، اندام ها و اشکال در تنفس) به وجود آمد، دارو را فوراً قطع

منابع : داروهای ژنریک ایران، دکتر رضا محتشمی

انتشارات آثار سبحان . ۱۳۹۶

کاپتوپریل چه عوارضی دارد ؟

از عوارض شایع کاپتوپریل می توان سرفه ، سرگیجه ، افت فشارخون ، سردرد ، تهوع ، خشکی مداوم دهان ، راش و کهیر و آنژیوادم را نام برد .

عوارض خطرناک این دارو ، سرکوب مغز استخوان ، کاهش شدید فشارخون ، آنژیوادم ، هایپرکالمی (افزایش پتاسیم خون) ، الیگوری (کاهش میزان برون ده ادراری) ، آنژین یا درد قفسه سینه ، افزایش ضربان قلب بیش از ۱۰۰ ضربه در دقیقه و طپش قلب می باشند .

مسمومیت با کاپتوپریل و درمان آن :

در این شرایط باید به دقت به افت فشارخون بیمار توجه شود. بیمار را به اورژانس بیمارستان منتقل کنید. در صورت نیاز، معده بیمار با واداشتن به استفراغ یا با شستشو تخلیه می شود .