

دارویی قرص آدانکور

جزا فراورده / نام ژنریک: Nicorandil

نیکوراندیل

طبقه بندی مارتیندل : داروهای قلبی عروقی
طبقه بندی درمانی : فاقد طبقه بندی فارماکولوژی-
درمانی AHFS

موارد مصرف نیکوراندیل

- پیشگیری و درمان آنژین صدری

مکانیسم اثر نیکوراندیل

- اثر بر کانال های پتاسیمی منجر به گشاد شدن عروق می گردد.

فارماکوکینتیک نیکوراندیل

- پیک پلاسمایی: ۳۰-۶۰ دقیقه
- متابولیسم: نیترات زدایی
- پروتیین بایندینگ: ضعیف
- دفع: ادرار (۱ ساعت)

عوارض جانبی نیکوراندیل

سردرد، تهوع/استفراغ، خستگی، گیجی، گرگرفتگی، درد عضلات، زخم های دهانی، افزایش ضربن قلب، درد شکمی، زخم های مقعدی، زخم های پوستی و مخاطی، افت فشار خون.

تداخلات دارویی نیکوراندیل

- مهارکننده های فسفو دی استراز-۵ اینهیبیتور. مثل: سیلدنافیل، تادالافیل و واردنافیل.
- داروهایی که برای درمان فشار خون بالا مورد استفاده قرار می گیرند.
- داروهایی که عروق خونی را گشاد می کنند.
- داروهایی که برای درمان افسردگی مورد استفاده قرار می گیرند.

هشدار ها نیکوراندیل

- در موارد زیر با احتیاط استفاده شود: فشارخون سیستولی پایین یا حجم خون پایین، حمله قلبی اخیر، ادم ریوی، زخم های دهانی، بیمارانی که داروهایی برای درمان فشار خون استفاده می کنند.

توصیه های دارویی نیکوراندیل

- این دارو با مصرف الکل یا فرآورده های حاوی الکل مثل الگیزیر تداخل دارویی دارد.
- از رانندگی و انجام کارهایی که به هوشیاری کامل نیاز است در ابتدای مصرف این دارو و تا هنگامی که اثرات این دارو برای شما مشخص شود خودداری کنید.

دارو های هم گروه نیکوراندیل

- لوومنتول
- سربرولیزین
- ساریلومب
- توفاسیتینیب
- فیتوسترول
- اوره
- ایکتیول
- سدیم تترادسیل سولفات
- فسفر
- پتاسیم متافسفات
- هیدروژن پراکساید
- پرمنگنات پتاسیم
- اب مقطر
- سولباکتام
- روغن بادام
- تری گلیسرید بازنجیره متوسط
- سلنیوم
- استارچ
- کلسیم دوسیلیات
- گلیسروفسفریک اسید
- هیالورونیک اسید
- ملاتونین



آدانکور



واحد آموزش به بیمار

تلفن سیکر 09165744677

شماره تماس: 06633408898

داخلی 135-145-143-137

سایت بیمارستان: madanil.iums.ac.ir

مراقبت های پرستاری

- قرصهای نیکوراندیل به روش خوراکی مصرف می شود.
- قرص ها باید صبح و عصر با یک لیوان آب فرو برده شوند. قرص نباید خرد شود و یا جویده شود.
- قرص را می توان به نصف تقسیم کرد.

قبل از مصرف نیکوراندیل

بعضی از داروها برای افرادی که دارای شرایط خاص هستند مناسب نیستند و گاهی اوقات از داروها می توان برای مراقبت بیشتر استفاده کرد. به همین علت، قبل از شروع مصرف نیکوراندیل، مهم است که پزشک شما بداند:

اگر باردار هستید یا شیر می دهید. اگر فشار خون پایین دارید. اگر اخیراً دچار حمله قلبی شده اید یا گفته شده است که نارسایی قلبی دارید. اگر مشکلی با ساختن مایع بالا در ریه دارید که ادم ریوی نامیده می شود. اگر تا به حال یک واکنش آلرژیک به یک دارو داشته اید. اگر مصرف داروهای دیگر را دارید این شامل هر گونه داروئی است که مصرف می کنید که بدون نسخه خریداری می شود و همچنین داروهای گیاهی و مکمل.

این دارو برای زنان باردار توصیه نمی شود مگر اینکه مطلقاً لازم باشد. این دارو برای زنان شیرده توصیه نمی شود مگر اینکه مطلقاً لازم باشد.

منبع: داروهای ژنریک ایران ، مرجان رسولی، فاطمه تیموری، اندیشه رفیع 2020

اشکال دارو

- نیکوراندیل قرص 10 م گ
- (آدانکور) نیکوراندیل قرص 10 م گ
- نیکوراندیل قرص 20 م گ
- (آدانکور) نیکوراندیل 20 م قرص

مقدار مصرف نیکوراندیل Nicorandil

محدوده درمان معمول 10 تا 20 میلی گرم دو بار در روز است. دوز ابتدایی معمول 10 میلی گرم دو بار در روز (پیشنهاد)، صبح و عصر است. توصیه می شود که در صورت لزوم، دوز با توجه به نیازهای بیمار، پاسخ و تحمل به مقدار بالا تا 40 میلی گرم دو بار در روز، به ترتیب بالا برود. دوز روزانه کمتر از 5 میلی گرم دو بار در روز ممکن است در بیمارانی که به ویژه در معرض سردرد قرار دارند استفاده شود. سعی کنید قرص های خود را در همان زمان هر روز مصرف کنید زیرا این امر به شما کمک می کند که به طور منظم دوزهای خود را مصرف کنید. شما می توانید قرص نیکوراندیل را قبل یا بعد از غذا مصرف کنید. قرص را با آب بخورید. اگر فراموش کردید که یک دوز را مصرف کنید آن را به محض یادآوری مصرف کنید (مگر اینکه تقریباً زمان برای دوز بعدی شما باشد در این صورت دوز از دست رفته را ترک کنید). دو دوز را با هم مصرف نکنید. سالمندان: هیچ دوز ویژه ای برای بیماران سالخورده وجود ندارد اما همانند تمام داروها، استفاده از کمترین دوز موثر توصیه می شود.