

موارد احتیاطی در مصرف قرص زیلت

در شرایط زیر این قرص را مصرف نکنید:
اگر به کلوپیدوگرل یا سایر مواد به کار رفته در قرص زیلت حساسیت دارید (بیش از حد حساس هستید).

اگر به بیماری زخم معده مبتلا هستید.
اگر به اختلال خونی مبتلا هستید که خطر خونریزی داخلی را افزایش می دهد (خونریزی داخل هر بافت، اندام یا مفصل بدن).

اگر در شریان مغز لخته خون به وجود آمده است (سکته ایسکمیک) که در هفت روز گذشته رخ داده است.

اگر از بیماری کبدی و یا کلیوی رنج می برید.
نکته بسیار مهم: اگر درد شدید قفسه سینه (آنژین ناپایدار یا حمله قلبی) را تجربه کرده اید، ممکن است قرص زیلت در ترکیب با استیل سالیسیلیک اسید (ماده ای که در بسیاری از داروها برای تسکین درد و تب پایین وجود دارد) تجویز شود. استفاده گاه به گاه از استیل سالیسیلیک اسید (بیش از 1000 میلی گرم در هر دوره 24 ساعته) معمولاً مشکلی ایجاد نمی کند. اما در مورد استفاده طولانی مدت باید با پزشک مشورت کنید.

عوارض جانبی قرص زیلت

عوارض جانبی قرص زیلت به شرح زیر هستند:

اسهال

درد شکم

سوهاضمه

سوزش معده

این عوارض، از عوارض معمول این قرص هستند.

عوارض غیر معمول (که زیاد در بین بیماران

مشاهده نمی شود) به شرح زیرند:

سر درد

زخم معده

استفراغ و حالت تهوع

یبوست

گاز در معده و یا روده

بثورات پوستی و خارش

سرگیجه

قرص زیلت برای جلوگیری از ایجاد لخته خون

(ترومبوز) در رگهای خونی (عروق) سخت شده مصرف می شود. این فرآیند معروف به آتروتریبوز است و می تواند منجر به حوادث آتروتریبوتیک (مانند سکته ، حمله قلبی یا مرگ) شود. این قرص در شرایط زیر کاربرد دارد:

فرد به بیماری سختی عروق مبتلا است (که به آن تصلب شرایین نیز می گویند)

فرد قبلاً دچار حمله قلبی و یا سکته مغزی شده است یا به بیماری شریانی محیطی مبتلاست

فرد نوعی درد شدید را در قفسه سینه تجربه کرده است که به آنژین ناپایدار معروف است یا دچار سکته قلبی و یا حمله قلبی شده است

به طور معمول نحوه مصرف این قرص به صورت زیر است:

روزانه یک عدد قرص 75 میلی گرمی

این قرص را می توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف کرد

این قرص همراه با آسپرین قابل استفاده است و خطر تداخل دارویی وجود ندارد
طول درمان حداقل 4 هفته است



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بیمارستان شهید آیت ا... مدنی



موضوع: زیلت

واحد آموزش به بیمار

تلفن پیگیری 09165744677

شماره تماس: 06633408898

داخلی 137-143-145-135

سایت بیمارستان: madani.lums.ac.ir

آموزش به بیمار

اگر می خواهید به دندان پزشکی بروید و یا جراحی داشته باشید باید پزشک را در جریان بگذارید که از این قرص استفاده می کنید

اگر عوارض جانبی نادر این دارو برای شما رخ داد (مانند زردی پوست، بثورات پوستی، تاول و غیره) سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

اگر زخمی بر روی بدن شما به وجود آمد و مدت طولانی طول کشید تا خونریزی قطع شود، سریعاً به پزشک مراجعه کنید. زیرا این امر با عملکرد دارو در ارتباط است و از ایجاد لخته های خون جلوگیری می کند.

برای بریدگی ها و جراحات جزئی، به عنوان مثال تراشیدن ریش که ممکن است زخم جزئی ایجاد شود معمولاً جای نگرانی وجود ندارد. با این حال، اگر نگران خونریزی خود هستید، باید سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.

زیلت برای استفاده در کودکان مناسب نیست و تنها برای استفاده بزرگسالان تجویز می شود.

منبع: مرجع کامل داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری، مرجان رسولی، فاطمه تیموری، اندیشه رفیع 1400

تداخلات دارویی

داروهای ضد انعقاد خوراکی و داروهایی که برای کاهش لخته شدن خون استفاده می شوند داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی که معمولاً برای درمان شرایط دردناک و یا التهابی عضله یا مفاصل استفاده می شوند

هپارین یا هر داروی تزریقی دیگری که برای کاهش لخته شدن خون استفاده می شود امپرازول، ایزومپرازول یا سایمتیدین و داروهایی برای معده

فلوکونازول

ووریکونازول

سیپروفلوکساسین یا کلرامفنیکل

داروهای برای درمان عفونت های باکتریایی و قارچی

فلوکستین

فلووکسامین یا موکلوبماید

داروهای برای درمان افسردگی

داروهای کاربامازپین یا اکسکاربازپین برای درمان برخی از انواع صرع

تیکلوپیدین و عامل ضد پلاکت دیگر.