

## فوروزماید (لازیکس)

- ضد فشار خون
- درمان کم ادراری ناشی از نارسایی کلیه

## اشکال دارویی:

- قرص، تزریق

## موارد مصرف دارو:

- افزایش فشار خون
- نارسایی مزمن کلیه
- فقدان ادرار

## موارد منع مصرف دارو:

- حساسیت شدید
- دوران شیردهی

## عوارض دارو:

- کاهش فشارخون وضعیتی
- افزایش قند خون
- کاهش کلسیم، پتاسیم و منیزیم

## روش استفاده از دارو و توجهات حین

### مصرف

- به منظور کاهش علائم سوزش و درد معده دارو را با غذا و یا شیر مصرف کنید.
- مصرف این دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد
- این دارو افزایش فشارخون را درمان نمی کند بلکه آن را کنترل می نماید از این رو مصرف دارو ممکن است تا پایان عمر ادامه یابد.
- به علت بروز کمی پتاسیم خون در هنگام مصرف دارو از رژیم پر پتاسیم استفاده شود( مثل موز، طالبی، حبوبات، انجیر، خرما)
- روزانه بیش از ۳-۲ لیتر مایعات مصرف نمایید.
- در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت دارو به محض به یاد آوردن باید آن را مصرف نمایید مگر نوبت مصرف بعدی رسیده باشد در این صورت نوبت بعدی نباید ۲ برابر گردد.

- در حین مصرف دارو از قرارگیری در معرض نور آفتاب خودداری کنید.

- اگر کم ادراری با حداکثر مصرف این دارو به مدت ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد توصیه می شود مصرف آن قطع شود

- اگر برنامه مصرف دارو یک بار در روز باشد به منظور جلوگیری از تکرار ادرار در طول شب این دارو باید صبح مصرف شود.

- در هنگام ایستادن به مدت طولانی، انجام فعالیت جسمانی یا در هوای گرم به علت اثر کاهنده فشارخون در حالت ایستاده باید احتیاط شود.

**علائم کاهش ورم پا و ساق پا نشانه بهبودی است.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان لرستان

مرکز آموزشی و درمانی

بیمارستان شهید آیت اله مدنی



فوروزماید (لازیکس)

واحد آموزش به بیمار

تلفن بیمارستان: 33408898

داخلی 135 - 137 - 143

سایت بیمارستان: [madani.lums.ac.ir](http://madani.lums.ac.ir)

- فشار خون را در وضعیت ایستاده و خوابیده کنترل کنید.
- از مصرف این دارو با قرص دیگوکسین خودداری شود.



منابع: فرهنگ جامع داروهای ژنریک  
ایران 1401 ( دکتر پونه حشمتی،  
احمدعلی اسدی) ناشر: مؤسسه  
انتشارات اندیشه رفیع.

- در صورت مشاهده کم آبی (ضعف، بی حالی و یا افت فشارخون مصرف دارو قطع شده و به پزشک اطلاع داده شود)
- علائم کاهش پتاسیم خون توجه شود (احساس ناخوشی، افت وضعیتی فشار خون، خستگی، افزایش ضربان قلب، سفت شدن عضلات ساق و یا ضعف)
- افزایش درجه حرارت بدن را کنترل نمائید
- حالت گیجی خصوصا در افراد پیر مهم است.

توجه: زمانی که این دارو به مقدار زیاد و به مدت طولانی مصرف می شود نواقص شنوایی و وزوز گوش ممکن است ایجاد شود.

## نیتر و گلیسرین

- ضد درد، گشاده کننده عروق رگها، کاهش دهنده فشار خون.
- این دارو باعث می شود نیاز عضله قلب به اکسیژن کم شود که این اثر را با شل کردن عضلات صاف جدار عروق اعمال می نماید.

## اشکال دارویی:

- قرص، کپسول، پماد، تزریقی

## موارد منع مصرف دارو:

- حساسیت شدید
- وارد شدن ضربه به سر
- خونریزی مغزی و افزایش فشار خون جمجمه

## عوارض دارو

- سردرد شدید
- سرگیجه
- تپش قلب

- کاهش شدید فشار خون

- خشکی دهان

## روش استفاده و توجهات لازم حین مصرف

- قرص ها را با یک لیوان و با معده خالی یک ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا مصرف نمایید.

- اشکال زیربانی را زیربانی گذشته تا حل شود قرص ها را در ظرف اصلی دارو نگه داشته و آنها را از جعبه خودش خارج نکنید.

- شکل پمادی دارو باید در نواحی سینه، ران، شکم، مالیده شود این نواحی باید فاقد مو باشد و به هیچ وجه نباید پماد را ماساژ داد و پس از زدن پماد فشارخون را کنترل نمایید.

## توجهات

- اشکال زیربانی وقتی با بزاق مخلوط شوند سبب احساس سوزن سوزن شدن غشاء مخاطی زبان می شوند که طبیعی است و نگران نباشید و مربوط به فعال بودن اثر دارو است.

- از مصرف هم زمان این دارو و با دیگر داروهای کاهنده فشارخون اجتناب شود زیرا باعث افت شدید فشارخون می شود.

- از مصرف الکل و سیگار جداً خودداری شود(باعث افت شدید فشارخون)

- در صورت بروز سردرد شدید، سرگیجه و برافروختگی و تپش قلب و کاهش شدید فشارخون سریعاً به پزشک معالج مراجعه شود که از عوارض دارو می باشد.

بیت‌الحیة  
حالیة



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان لرستان

مرکز آموزشی و درمانی

بیمارستان شهید آیت اله مدنی



موضوع:

نیتروگلیسرین

تهیه کننده:

مژگان عباسی موسوی

شهر یورماه 93

- در صورت بروز تاری دید یا خشکی دهان قطع مصرف دارو و مشورت با پزشک خود در صورت سردرد استفاده از استامینوفن و مسکن و اطلاع به پزشک برای تغییر دارو در صورت لزوم

**نکته: عوارض سردرد نیتروکانتین کمتر از ایزوسور باید است.**

- قرار ندادن نیتروگلیسرین در معرض هوا، گرما، رطوبت و نگه داری دارو در محلی خنک و خشک

منابع:

فرهنگ جامع داروهای ژنریک و گیاهی ایران (تألیف دکتر پونه حشمتی و احمدعلی اسدی)

ناشر: مؤسسه انتشاراتی اندیشه رفیع.

- اگر احساس غش، سرگیجه یا سیاهی رفتن چشم را داشتید در زمان استفاده از قرص های زیرزبانی چند نفس عمیق بکشید و سرتان را بین دو زانوی تان نگه دارید تا این که این احساس از بین برود.

- قرار ندادن ظرف حاوی نیتروگلیسرین داخل جیب

- لزوم همراه داشتن دارو برای بیماران قلبی

**توجه: به هنگام درد قطع فعالیت و بلافاصله استراحت و گذاشتن یک قرص زیرزبانی**

- اگر با گذاشتن یک قرص درد رفع نشد به فاصله ۵-۱۰ دقیقه قرص دوم در صورت برطرف نشدن درد، قرص سوم رانیز به فاصله ۱۰-۵ دقیقه و در صورت عدم بهبودی مراجعه به نزدیکترین بیمارستان یا مرکز درمانی