

پلاویکس

طبقه بندی درمانی: ادغام بازدارنده پلاکت

اشکال دارویی: 75mg

پلاویکس حاوی دارویی به نام کلوپیدوگرل از گروه داروهای مهارکننده پلاکت می باشد. پلاکت ها ساختارهای بسیار کوچکی در خون هستند که با تجمع و اتصال به یکدیگر فرایند تشکیل لخته را موجب می شوند. داروهای مهارکننده پلاکت با جلوگیری از تجمع پلاکت ها از تشکیل لخته جلوگیری می کنند.

پلاویکس در بالغین مبتلا به تصلب عروق برای پیشگیری از لخته شدن خون و پیامدهای ناشی از آن مثل سکته مغزی ، حمله قلبی و مرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

مدت مصرف پلاویکس

ادامه مصرف پلاویکس تا مدت مشخص شده توسط پزشک بسیار حائز اهمیت است. این مسئله به خصوص در بیمارانی که تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر قرار

1

گرفته اند مهم تر است. چون قطع زودتر از موعد دارو می تواند سبب ایجاد لخته و گرفتگی در عروق قلب و فتر گردد.

در افرادی که آنژیوپلاستی عروق قلب (کارگذاری فتر) شده اند مدت زمان مصرف دارو بر اساس نوع استنت(فتر) فرق می کند بیمارانی که فتر دارویی برای آنان استفاده شده است لازم است مدت طولانی تری از این دارو استفاده کنند که این مدت حداقل شش ماه تا یک سال می باشد. در بیمارانی که فتر غیر دارویی دارند حداقل مدت یک ماه از این دارو باید استفاده کنند. البته توصیه می شود که در مورد ادامه یا قطع داروی پلاویکس حتما با پزشک معالج خود مشورت کنید.

اطلاعات دارویی

از آنجا که پلاویکس مانع ایجاد لخته خونی می شود ، می تواند باعث تشدید خونریزی حتی متعاقب یک آسیب جزئی گردد .

2

بنابراین باید متعاقب بروز خونریزی که متوقف نمی شود، به پزشک خود مراجعه و با او مشاوره نمایید.

احتیاطات:

1. هرگاه با خونریزی در یکی از اعضا خود مانند معده و روده روبرو شدید .
2. مشاهده مدفوع خونی یا سیاه رنگ
3. استفراغ خونی یا سرفه هایی به همراه دفع خون
4. تب، علائم عفونت یا خستگی شدید که ممکن است ناشی از کاهش نادر بعضی از سلول های خونی باشد.
5. علائم اختلال کبدی مثل زردی یا بدون خونریزی های زیرجلدی به صورت نقاط ریز قرمز و گیجی.
6. تورم در دهان یا پوست به صورت دانه های پوستی و خارش و تاول که ممکن است نشان دهنده واکنش حساسیتی باشد.

3



بیمارستان شهید آیت اله مدنی



قرص پلاویکس

واحد آموزش به بیمار

تلفن بیمارستان: 33408898

داخلی 135-137-143

سایت بیمارستان: madani.lums.ac.ir

- دارو را در ساعت خاص از روز مصرف کنید که آن را فراموش نکنید
- اگر روزی فراموش کرده اید که قرص را خورده اید یا نه یک قرص دیگر مجدد مصرف کنید.
- در صورت بروز عوارض گوارشی حتماً به پزشک خود اطلاع دهید
- قبل از تمام شدن بسته قرص بعدی را تهیه نمایید تا مصرف دارو به تعویق نیفتد
- از عوارض فراموش کردن و نخوردن قرص پلاویکس، ایجاد لخته در فتر و ایجاد سکنه قلبی می باشد.

منابع: فارماکولوژی کاتزونگ سال 2021
انتشارات تیمور زاده.

7. خونریزی طولانی در زمان مصرف پلاویکس

ممکن است به دنبال بریدگی و آسیب، دچار خونریزی طولانی شوید. این حالت به عملکرد دارو در مهار تشکیل لخته مربوط می شود که در صورت آسیب خفیف مثل بریدگی یا اصلاح، اهمیتی ندارد. با این وجود، در صورت نگرانی از خونریزی فوراً به پزشک مراجعه کنید.

آموزش به بیمار

- در صورتیکه به پلاویکس آلرژی و حساسیت دارید ، یا اگر مبتلا به خونریزی فعال مانند خونریزی از زخم معده و یا خونریزی مغزی (ناشی از ضربه مغزی) هستید ، هرگز پلاویکس مصرف نکنید .
- قبل از مصرف پلاویکس هرگونه حساسیتی که نسبت به داروها دارید را با اطلاع پزشک برسانید.